

Gratiosissimæ Facultatis Medicæ

consensu

21

DISPUTATIONEM MEDICO-
CHIRURGICAM

DE

CATARACTA

In Academia Patria

PRO LOCO

Suò tempore in eadem obtinendo

Placido Eruditorum Examini

submitte

OLYCARPUS Gottlieb Schacher

Philos. & Med. Doct. atqve Anatom. & Chirurg.

P. P. Extraord.

RESPONDENTE

Georg Friedrich Zäschke/ Stroppa-Siles.

M. C.

ad diem 28. Octobr. M. DCCI.

L I P S I Æ,

Typis JO. CHR. BRANDENBURGERI.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF MEDICINE

LABORATORY

ATOMIC

ANALYSIS

PRO LOGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LABORATORY

DEPARTMENT OF MEDICINE

LABORATORY

ATOMIC

ANALYSIS


PRO LOGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LABORATORY

ATOMIC

ANALYSIS



P R O O E M I U M.



Quantæ sanitatis tuendæ præsidia Medici ab animantibus brutis didicerint, ex Aristotelis, Plinii aliorumque scriptis abundè innotescit. De hirundinibus quippe fertur, eas primùm herbæ chelidonii mirabilem, quam in visu exerit, virtutem docuisse, utpotè quæ pullorū oculos ea oblinire & roborare dicuntur. Palumbes, merulæ, & perdices lauri foliis se purgando, horum usum manifestarunt. Serpentes palpebris sceniculo oblitis obtusam oculorum aciem sibi acuere perhibentur. Neque verò tantum plurium pharmaceuticorum, sed chirurgicorum quoque remediorum notitia brutis debetur. Phlebotomiæ enim inventio plerumque Hypotamo tribuitur, qui, cum ex sanguinis copia malum sentit, ad spinosas ripæ cannas femore affricto venam sibi pertundere dicitur. Artificium cataractas deponendi capræ adscribitur, quæ in spinosas frutices incidens pupillæ cataractam depresso, sicque visum recuperavit. Non vacat plura in præsentiarum persequi, atque in horum veritatem inquirere, cum animus sit, postremi affectus, cataractæ puta, naturam & curam fusiùs exponere. Hoc ut ex voto succedat, supremum NUMEN ardentissimis precibus veneramur.

CONSPECTUS Totius Disputationis.

§. 1. Cur tractationis initium à nominis consideratione sit faciendum, ratio redditur. §. 2. Cataractæ definitio tum nominalis tum realis exhibetur. §. 3. Oculi bulbi, cataractæ subjectum constituentis, anatomica structura præmittitur. §. 4. Quot sint oculi partes, disquiritur, quâ occasione Auctorum dissensus circa numerum membranarum definendum animadvertitur. §. 5. 6. 7. Octo oculorum tunicae exponuntur. §. 8. 9. 10. Vasa sangvifera, nervi, & ductus aquei ad examen vocantur. §. 11. 12. & 13. Humor aqueus crystallinus & vitreus una cum visione explicatur. §. 14. Cataractæ subjectum speciale esse humorem aqueum & pupillam, probatur, Plurimūq; sententia rejicitur. §. 15. Cataractæ duplex datur differentia, altera à consistencia, quâ in immaturam, maturam & inveteratam, altera à colore petita, cujus intuitu in flavam, viridē &c. dividitur. §. 16. Num à sola aquei humoris inspissatione, an verò ab aliunde accedente materia suffusio nascatur, disquiritur. §. 17. Sanguinem quandoque nocivam advehere materiam asseritur. §. 18. Nonnunquam cataractam ab oculorum inflammatione &c. oriri, aliquando eam esse malum nativum, ostenditur. §. 19. J. de La Charriere sententia de cataractæ generatione ventilatur. §. 20. In colorum cataractæ diversitatem inquiritur. §. 21. Signa cataractæ diagnostica recensentur. §. 22. Signa, quibus cataractæ ab aliis affectibus

distingvitur, enumerantur. §. 23. 24. 25. Signa prognostica à cataractæ consistencia, colore, & agroti conditione desumuntur. §. 26. Cura ad ductum divisionis, quâ cataracta in immaturam, maturam & inveteratam dividitur, pertinetur, atque suffusionis immature remedium diæticum exponitur. §. 27. Ex fonte pharmaceutico medicamentatum interna tum externa depromuntur, quorum illa examini subjiciuntur. §. 28. Topica selectiora proponuntur. §. 29. Fonticuli & setacei usus laudatur. §. 30. Quid circa operationem, cataractæ perfectæ dicatam, animadvertendum veniat, notatur. §. 31. Operator quomodo debeat esse comparatus, docetur. §. 32. Tempus ad operationem aptum determinatur. §. 33. Acus vulgaris, cataractæ depositioni destinata, delineatur. §. 34. Quid de Nuckii duplici acu sit sentiendum, ostenditur. §. 35. Mattioli, Burrhi ac nonnullorum recentiorum acus ad examen vocantur. §. 36. Acus vulgaris applicandi modus declaratur. §. 37. Variæ circumstantiæ, ad perficiendam operationem scitu necessarie ponderantur. §. 38. Fasciationis modus describitur. §. 39. Remedia, finitâ operatione, in usum deducenda indigitantur. §. 40. Oculo, cataractâ inveteratâ laboranti, quomodo oculo artificiali sit succurrendum, demonstratur, atq; clausula Disputationi imponitur.

§. I.



Ataractæ naturam & curationem indagaturi, non inutile fore autumamus, paucula, ad dilucidio-
riorem nominis explicationem facientia, prælibare, cum ad ingeniosissimi Socratis mentem initium doctrinæ sit nominis consideratio.

§. 2. Vox itaque Cataracta, natales deducens à *καταράττω* impe-
tuoſe deturbare, tribuitur plerumque iis, quæ cum impetu ex alto ru-
unt, inde aves prædatrices, aquilæ atque falcones, quod in prædam ex
alto ruant, cataractæ dicuntur. Fluvii, qui ex montium cacuminibus
inſigni aquarum ſtrepitu præcipitantur, eodem nomine veniunt. Nu-
bes, nimbos largos & cum impetu profundentes, cataractæ coeli apertæ
audiunt. Fores penſiles, ex ligno ferroque fabricatæ, quæ ex alto de-
miſſæ occludunt portas, quales in oppidis vetuſtis etiamnum occurrunt,
cataractæ ſubinde appellantur. Obex ſeu vectis, quo porta obfir-
mari ſolet, eodem inſignitur titulo. Per ſimilitudinem vocabulo ca-
taractæ indigitatur affectus oculi, viſionis debilitatem ſeu cœcitatem in-
ducens, qui alias Hypochyma, Suffuſio, Germanis *der Staar* dicitur.
Quamvis enim hujus affectus materia non ubertim per amplas quaſi
cataractas irrumpat in oculos; ſicuti tamen obex foribus, ita catara-
cta pupillæ præfigitur, & quemadmodum fores pendulæ occludendo
portam hoſtium prohibent introitum, ſic pariter materia ſpiſſa, catara-
ctam conſtituens, pupillam plus minus obſcurando radiorum lucido-
rum interturbat irruptionem, inde ægroti aut laſionem aut privatio-
nem viſus experiuntur. Cæteroquin cataracta nonnunquam generi-
co ſenſu adhibetur, ita ut ſuo ambitu omnes ſpecies complectatur,
quandoque vero ſpecifico ſumitur ſenſu, quo illi gradu tantum tribui-
tur, ubi cataracta in pelliculam jam jam eſt condenſata. Nos in præ-
ſentiarum priori ſenſu ſumptam cataractam deſcribimus, quod ſit mor-

bosa oculi constitutio, qua materia plus minus opaca humori aqueo inexistens pupillæ aut totaliter, aut partialiter prætenditur, cum notabili visionis læsione, aut totali ejusdem privatione.

§. 3. Quamvis Creator benignissimus homini gemellos dederit oculos, ut alterius actione læsa, alter visui adhuc præesse possit, cataracta tamen non raro utriusque actionem nunc lædit, nunc prorsus destruit, sicque miseros ægrotantes visu plenarie privat. Præsentis ergo affectus subjectum sunt oculi, quorum accuratiori indagini aliquid temporis impendemus. Supervacaneum vero ducimus, ossæarum orbitarum, in quibus oculi collocantur, palpebrarum, quibus antèrius muniuntur, musculorum, quorum beneficio variis ducuntur motibus, glandularum, quarum sero exterius irrigantur, pinguedinis, cujus unctuositate lubricantur, fabricam in præsentem exponere, cum harum partium notitia nil quicquam ad naturam cataractæ dilucidandam facere videatur. Exquisitius proinde examen meretur oculi bulbus, utpote huic affectui unice obnoxius.

§. 4. Primariæ partes, ex quibus oculi globus compingitur, sunt membranæ seu tunicæ, vasa & humores. Quod ad tunicas spectat, de earum numero magna lis est inter Anatomiz Proceres. Siquidem alii quatuor, quinque, sex pluresve, alii contra non nisi tres statuunt. *Ruyschius*, hodiernorum Anatomicorum facile Princeps, octo oculorum tunicas enumerat, quarum primam dicit adnatam seu conjunctivam, secundam tendineam, tertiam scleroticam, quartam choroideam, quintam *Ruyschianam*, sextam retinam, septimam crystallinam, octavam vitream, vid. hujus *Autoris Responsio, quam dedit ad Epistol. Anatom. Probl. XIII.*

§. 5. Adnata seu conjunctiva, oculi bulbum orbitæ atque palpebris conjungens, continua est cum pericranio. Hoc enim, ubi palpebras succinxit, reflectitur quasi atque supra scleroticam usque ad peripheriam corneæ expanditur. Secundum naturam elegantis est albedinis, inde quoque album dicitur oculi, quæ tamen subinde ophthalmiæ vel icteri tempore inflavum aut rubicundum mutatur colorem. Huic immediate subjacet tendinea, quæ est non nisi subtilis tendinum musculorum expansio, ad circumferentiam corneæ usque producta. Ambæ
sensu

sensu satis acuto gaudent, hinc acu, cataractæ depositioni dicata, punctæ, molestiam plus minus notabilem creant ægrotis. Licet vero adnata æque ac tendinea oculi bulbum obtegant, hunc tamen non totum amiciunt, nec ipsi sunt propriæ, inde non male communibus oculi integumentis annumerantur.

§. 6. Remotis hisce involucribus sclerotica prodit in conspectum. Hæc totum oculi globum ambiens à dura matre originem trahere creditur, estque crassa, densa, dura, posterius atq; lateraliter opaca, antè splendor & pellucidi cornu instar polita atq; transparens, hinc quoq; ea parte corneæ tunicæ nomen gerit, ac non difficulter in duas pluresve lamellas dividitur, inter quas nonnunquam pus aut sanguis extravasatus colligitur, unde visus, pelluciditate ipsius obtenebrata, notabiliter læditur. De cætero sensu pollet obtuso, hinc suffusi cataractæ depositionis tempore ex ejus punctura vix perceptibilem sentiunt molestiam. Huic substernitur choroides seu uvea, quæ propago piæ meningis esse perhibetur, hæc totum oculi globum haut cingit, sed antè, ad introitum lucis parandum, fenestrata est. Convexa æque ac concava ejus superficies atrato quasi pigmento perfunditur, ut cameræ obscuræ in modum interior oculi cavitas tenebricosa reddatur. Hinc inde vasculis intervenientibus scleroticæ laxè jungitur, firmiter vero ligamento membranoso extremitati corneæ annectitur. Hæc membrana ex oculi fundo ad pupillam usque producta ex una parte iridem, ex altera processus ciliares effingit. Iris anteriorem uveæ partem constituens, atq; vario colore picta humori aqueo innatat, & ex fibris partim rectis à foramine rotundo i.e. pupilla ut centro in ambitum diffusis, partim orbiculato ductu reptantibus construitur, quarum beneficio obscure movetur pupilla. Processus ciliares posterius producti, atq; in strias rectas dispositi, per tunicam vitream æque ac crystallinam diffunduntur. Quinta tunica est interior choroidis lamella, atque ab inventore Ruyschiana dicitur. Quamvis enim *Guilielm. Briggs Ophthalmogr. C. III. Plèmpius Ophthalmogr. L. I. c. X. p. 14.* aliive de anterioris uveæ partis i. e. iridis duplicatura commemorarint, nullus tamen Anatomicorum, quantum quidem mihi constat, præter Ruyschium duplicem lamellam in parte hujus tunicæ postica huc usque demonstravit. *Hæc tunica vero Ruyschiana choroidæ,* sunt verba Auto-

ris, tam firmiter connata est, ut vulgari sectione anatomica in oculos haut incurrat. Artificiose infarseram choroideæ tunica arterias, quas cum suspensâ manu tractarem, recedebat tunica Ruyschianæ exigua portio à choroideæ, hoc à me viso, suspicari coepi, annon tunica choroideæ esset gemina & artificio quodam in duas lamellas separabilis, hoc ex voto bis successit, & portionem satis magnam à choroideæ separabam, per quam æque bene, ac per choroideam observabam arterias peculiare, diverso reptatu reptantes, esse dispersas. Hanc pelliculam acriter in Epistola quadam ad Autorem data impugnavit Cl. Dn. D. Rau, natione Germanus, atque Medicus ac Operator Amstelodamensis satis famosus, quo jure quove successu, aliis judicandum relinquimus. Minimum exoptandum esset, ut præter necessitatem urgentem partium denominationes haud multiplicarentur. Quod si enim singulæ lamellæ, in quas sclerotica aliæque tunica dirimi possunt, peculiaribus denominationibus forent insigniendæ, verendum omnino esset, ne studium anatomicum, ob nominum varietatem jam satis laboriosum, magis adhuc redderetur operosum atque exosum. Sequitur retina seu retiformis, quam plurimi Anatomicorum pro substantia medullari nervi optici habent, cujus filamenta in modum reticuli diducta, atque in membranam explicata, amplectuntur humorem vitreum, atque ad ligamentum, quo uvea cum corneæ extremitate conjungitur, terminantur. Quamvis Ruyschius medullosum appositum quid esse dicte tunica existimet, ejus originem ab arteriarum extremis deducens. Hanc membranam esse primarium visionis organum, hodiè vix ab ullo amplius in dubium vocatur.

§. 7. Explicatis hisce membranis, eæ adhuc binis verbis commemorandæ veniunt, quæ humores, ne inter se confundantur, immediate cingunt, quarum altera crystallina, altera vitrea audit. Illa summe subtilis humorem crystallinum, hæc pariter tenuissima vitreum investit, atque postrema plurima de se fundere videtur filamenta, quæ in cellulas efformata, liquidas humoris vitrei particulas continent.

§. 8. Oculorum membranas, vasa nunc ordine sequuntur, quibus secundum naturam ditantur. Ex iis primo loco arterias nominare placet, quarum externæ, in albuginea oculi tunica cum primis specta-

spectabiles, ortum ab externo carotidis ramo trahunt, internæ à ramo carotidis interno prodeunt, atque optico nervo associatæ non modo pluribus ramificationibus scleroticam perreptant, sed & ejusdem partem posticam æque ac mediam haud paucis ramusculis perforant, qui deinceps densissimo agmine per uveam atque retinam distribuuntur. Num vero & ad humorum pelliculas ferantur, hætenus oculatissimus Ruyschius demonstrare nequivit. Hisce enim verbis Wedelii, Æsculapii Jenensis filium, natusi fallor minorem, affatur: *Vitream & crystallinam hætenus vasis sanguiferis destitutas offendi, id quod tibi Exper. Vir quoque demonstravi, noli autem exinde de eorum existentia dubitare.* Sanguinem arteriarum ope adductum, atque à nutritione residuum venulæ denuo absorbent, quæ ex minoribus surculis in majores coalescentes eundem, ad cor reducendum, jugularibus tum internis tum externis infundunt.

§. 9. Oculi globum à nervo optico, tanquam malum à suo petiolo pendere, communis est Anatomicorum sententia. Hic enim in scleroticæ partem posticam hujusque circiter centrum insertus, dura piaque meninge emissa, in tunica retiformi consumitur, huicque spiritus ad visum absolute necessarios adducit. Præterea tertium nervorum par ramulum quendam de se spargit, qui cum ramusculo quintæ conjugationis commixtus ganglion efformat, ex quo plura prodeuntia filamenta ac nervum opticum circumligantia per scleroticam atque interiora distribuuntur.

§. 10. Insuper per scleroticæ partem exteriorem duo plerumque ductuli, limpidi humore turgidi, disseminantur, quique serum suum in cavum, quod est inter corneam & humorem crystallinum deponunt. Hos ductus *Nuckius*, percelebris quondam Anatomicus, primus detexit, eosque ductus oculorum aquosos nominavit. *Warnerus Chrouet* in *Dissert. med. phys. de trium oculorum hum. orig. & solut. Apolog. ad Obj. Nuckii*, hos ductus strenue impugnat, asserens, eos veras esse arterias non liquorem limpidum, sed sanguinem vehentes, quodque duplici experimento, abs se instituto, probat, altero, quo liquorem in ductulos sic dictos aqueos injecit, qui torrentis instar per arteriam carotidem effluxit, altero, quod in molosso adornavit, utpote quem eum in finem strangulatum scalpello anatomico subjecit, in quo ductus hosce sanguine repletos observavit. Adeoque existimat *Cl. Aut.* humorem aque-

um transpirando per arteriolarum poros generari. At enim vero primū quod concernit experimentum, id suspectum quodammodo videtur. Sicuti enim flatus atque liquor, in arteriam renum aliarumve partium immisus, subinde immediate ad vasa lymphatica transit; ita hoc quidem immediatum nexum, qui est inter arterias & vasa lymphatica, ostendit, usum tamen propterea lymphaticorum non evertit, quale iudicium esto quoque de aqueis ductibus. Quare posterius experimentum magis stringere videtur ductus Nuckianos, cum tamen *Munnicks in Libr. de Re Anatom. p. 184.* aliive testentur, se ductulos hosce limpidi humore turgidos sæpius observasse, dubii adhuc hæremus, annon ductus aquosi locum etiamnum inveniant. confer. *Nuck. defens. duct. aquos.* Operæ pretium erit sententiam, quam accuratissimus *Ruyschius* de iis fovet, hic transcribere: *Observo, inquit, prælaudatus Autor in Epist. supra citata, ductum à clarissimo Nuckio detectum (quantumvis non raro nostra repletionem aliquid materia ceracea admiserit, imo in objecto recenti aliquid sanguinolenti in eo invenerim peculiarem esse ductum, cum vena in totum haut convenientem. Per dictam tunicam, pergit, mihi videre videor, plurima vascula nova, secundum longitudinem decurrentia, quæ neq; sanguiflua, neq; lymphatica esse reor, quantumvis lymphaticorum æmula sint, quæ in totum cum iis haut conveniunt: dico, quod mihi videre videor, quia tanta in re haut libenter aliquid proferrem, nisi certissimas factus: Memini me olim hæc quoque vidisse in oculo flaccido, sed vero suspicabar rugosas esse particulas limpidas à flacciditate productas, jam vero in oculo rigido expansoque sese videnda exhibent. Si conjectura locus sit, non alienus essem ab ea opinione, per ea reduci humorem aqueum, qui per ductum à Nuckio inventum, aut per alium ignotum adfertur.*

§. II. Humores, quibus oculi globus repletur atque distenditur, tres numerantur, aqueus puta, crystallinus atque vitreus, consistentia multum inter se discrepantes, pellucidi tamen omnes, colorisq; expertes, ut sic radii visibiles propriis suis coloribus accuratius exprimerentur. Inter hos aqueus humor situ est prior, spatium illud, quod corneam & humorem crystallinum interjacet, replens, peculiari membrana haud comprehensus, utpote cujus limites ligamento, quo uvea sclerotica jungitur, circumscribuntur. Tenuis hic ac pellucidus humor corneæ convexitatem servat, augetq;, hinc casu aut consilio dissipatus corneam

neam non sine visionis læsione rugosam efficit, eo tamen denuo naturæ beneficio restituto, atque cornea rursus expansa convexaque reddita, animal de novo visus integritatem recuperat. Ex quo fonte proveniat humor hicce, constat ex §. antecedenti.

§. 12. Humor medium occupans locum, crystallinus audit, ob pelluciditatem & claritatem, qua puræ crystalli instar transparens est, nomine hoc condecoratus. In medio oculi quidem situs est, propius tamen ad pupillam inclinatus, quo copiosiores radios excipere queat. Figura lentem æmuletur, cujus superficies antica est depressior, postica magis globosa ac rotunda, quaque parte sinu, humori vitreo insculpto, excipitur, eique arcte cohæret. Humor hicce ex animalibus vivis aut brevi interemtis extractus, atque propria membrana denudatus, aspectu æque ac tactu glutinosus viscidusve est, ita ut digitos mucaginosa quadam inficiat materia. Mirum vero est humorem huncce aëri liberiore expositum, aut igni commissum, nequaquam diffuere, sed duritiem corneam, imo fere osseam acquirere. Nos eundem, propria membranula exutum, soluturi in aquam fort. aqu. reg. spirit. nitr. sp. sal ammon. tinct. tartar. acr. ol. anis. destillatum &c. injecimus, tantum tamen abfuit, ut inde fuerit solutus, ut potius magis magisque induruerit, ita ut deinceps facili negotio in elegantissimas squamulas, ex filamentorum aliquot millibus constructas, potuerit resolvi, quales quoque *Leewenbackius* indefessus Naturæ scrutator delineatas dedit in *Tr.* cui titulus, *Ondervinding, waar in gehandelt werd over het maaksel van't humor crystallinus.*

§. 13. Totam denique posteriorem oculi capacitatem replet occupatque humor, qui à similitudine, quam habet cum vitro fuso, vitreus dicitur. Hic mole reliquos superans antè sinu exiguo crystallinum fovet, posterius globositate retinam insigniter distendit, distentamque aptam reddit ad excipiendos radios visivos. In visu quippe incidunt radii lucidi, rerum imagines gerentes, per utriusque oculi corneam, pupillam, humoresque ad tunicam retinam usque, in qua eorum ideæ repræsentatæ certo modo afficiunt spiritus, quorum adminiculo mens deinceps rerum visibilium conscia redditur. Num autem repræsentatio rerum adspectabilium fiat tanquam in speculo, ubi omnia tali, quali offeruntur situ, depinguntur, an vero tanquam in

camera obscura, ubi omnia inverso modo sistuntur, nostrum nunc non est determinare, qui de natura cataractæ enucleanda magis sumus solliciti.

§. 14. Cum supra monitum fuerit, oculos in genere præsentis affectus esse subjectum, ordinis nunc jubet ratio, ut in hoc specialius inquiramus. A vero proinde nos haut aberraturos esse existimamus, si humorem aqueum atque pupillam ut principalem hujus mali sedem consideremus. In principio quippe hujus affectus pelluciditatem humoris aquei non modo notabiliter turbat materia quædam sp. lla, sed hæc successu quoque temporis in illo in membranulam plus minus opacam condensatur, quæ interea temporis radices in iridis peripheria i. e. pupilla figit, eamque postmodum penitus obvelat atque occludit. Equidem *Fort. Plempius Ophthalm. L. V. C. 24.* existimat, cataractam in humore crystallino æque ac vitreo interdum sedem invenire, hisce inductus rationibus, quod uterque transmissioni radiorum inserviat, atque materia suffusa quandoque in hoc illove consistat. *Itaque inquit, si specierum transmissio à crassa atque opaca in vitreo stagnante materia prohibeatur, suffusione oculus indici debet laborare tam æquo jure, quam si in aqueo humore natet materia.* Ast enim vero sicuti cornea & radios lucidos transmittit, & obstructionibus est obnoxia, atque nemo Practicorum ea propter hujus pterygium aut hypopyum vocitat suffusionem; ita pariter suffusa materia, stagnans in humore crystallino vel vitreo, probe distinguenda est à cataracta, præprimis cum hæc subinde curationem admittat, illa omnem ordinarie respuat medelam.

§. 15. Cataractam omni tempore non eandem præ se ferre faciem, ex supra dictis jamjam innotescit, inde non male melioris doctrinæ gratia in immaturam, maturam, & inveteratam dispecitur. Immatura seu imperfecta dicitur, quæ consistentiam habet tenuem atque ad depositionem est inepta. Nonnunquam enim humor aqueus corpusculis opacis non continuis, sed divulsis scatet, unde pusilli culices, muscæ, lanarum filamenta, aliæve insuetæ res ante oculos obversari videntur. Quia namque radii lucidi, in hunc irruentes humorem, variis modis ab heterogeneis particulis alterantur, non potest non fallax fisci idea in tunica retiformi dicta. *Archibal-*
dus

duſ quidem *Pitcarnius Diff. Med. Orat. I. §. 14. & ſeqq.* multis rationibus, ex optica deſcriptis, oftendere conatur, taliuſmodi ſimulacra ab humoris aquei impuritatibus deduci non poſſe, cunctas tamen infringere videtur experimentum, quod in *Differt. de Oculo, à Magiſtro Wolffg. Erneſt. Wagnero habita*, legitur. Scilicet ſubtilis hic Philoſophus atq; Medicus in oculo artificiali, quem ſibi ingenioſiſſime conſtruxit, unum alterumve pulviſculum tenuiſſimum indidit aquæ humoris aquei vicariæ, illico, inquit, & per cryſtallinum in retina apparuerunt varia hinc inde volitantia, & ſimilem manu ſuppeditas ferente licebat efficere oculi agitationem, qualem alias in oculo naturali muſculi nervorum fluore actuati, præſtare ſolent. §. 14. Alio tempore corpusculum magis conſpicuum & opacum hoc illudve pupillæ latus occupat, reliquo permanente perſpicuo, & tunc viſio quidem adhuc procedit, aſt non tam late pater. Quia enim pupillæ anguſtia copioſiorum radiorum ingreſſum prohibet, uno tempore plura conſpici nequeunt. Tandem quandoq; pellicula tenuis, mobilis, & facile diſſolubilis totam obnubit pupillam, & tunc ægroti omnia per medium craſſum, ceu ſumum aut nebulam vident, vel iſſis omnia, pro cataractæ colore, certo modo colorata apparent. Quoniam vero hæ cataractarum ſpecies, quarum primam nonnulli ſuffuſionem, alteram aquam, & poſtremam cataractam ſpecificè dicunt, acu deponi nequeunt, inde quoque recte pro immaturis ſeu imperfectis habentur. Quod ad maturam attinet, ea firmiorem obtinet conſiſtentiam atque ad deſiſitionem eſt apta. Hæc viſum ſummopere deſtruit, ita ut æger oculo affecto præter lucis crepuſculum vix quicquam aliud videat, imo nec hoc viſu amplius diſcernere queat. Cum enim pellicula opaca firmaque ſatis totam plerumque integat pupillam, tranſitu radiorum viſivorum vel ex toto, vel maximam partem ſufflaminato, neceſſario ſumma viſionis debilitas aut cœcitas oritur, quæ tamen quandoque artiſicioſa pelliculæ deſiſitione emendatur. Invetrata denique appellatur, quæ juſto ſolidiorem conſiſtentiam naſta, deſiſitioni eſt inepta. Siquidem quandoque contingit, ut pellicula craſſam nimis imo corneam pene induat naturam, atque cum iride aut etiam cornea pertinaciſſime connectatur, & tunc non modo oculus viſu plenarie privatur, ſed & pellicula taliuſmodi nullo pacto acu decuti poſteſt. Cateroquin pleræque recensitarum cataractarum

species variis pingi solent coloribus, albo puta, seu lacteo, cinereo, cœruleo, viridi, flavo, fusco, rubro similive, uti experientia pene quotidiana testatur.

§. 16. Equidem in confesso est, naturam cataractæ in materia plus minus opaca, crassa, membranam interdum redolente, colorata, atque pupillam partialiter vel totaliter obscurante, consistere, verum tamen, quomodo taliusmodi substantia generetur, atque hoc, nunc illô tingatur colore, explicatu difficile satis est. Ex alibi dictis constat, in omni suffusione aqueum humorem insignem pati alterationem. Quamdiu enim hic pelluciditate atque fluiditate gaudet legitimâ, tam diu, cæteris paribus, visus est integer, quam primum verò à sua puritate recedit, & crassior evadit, visio tunc obtenebratur, atque suffusio fieri incipit. Quæritur proinde, num à sola aquei humoris inspissatione, an verò ab aliundè adveniente materia suffusio nascatur? *Platerus Pr. L. I. C. VII. p. m. 233.* priorem tuetur sententiam, variasque ad eam corroborandam adducit rationes, hæ verò cum maximam partem regulis anatomicis repugnent, earum refutationi haud immorabimur, sufficiat monuisse, humorem aqueum, chymicè examinatum, copiosissimas aqueas, paucas salinas viscidasve particulas exhibere, quibus iustâ quantitate mixtis exsurgit humor clarus pellucidusque. Hic ergò si inspissari sine materiæ accessu debeat, maxima humoris aquei pars exhalet, necesse est. Cum verò hoc fieri nequeat sine corneæ corrugatione, quam tamen in omni suffusione haud observamus, concludi oportet, humori aqueo, quantitate licet haud imminuto, materiam peccantem communicari.

§. 17. Sangvinem quandoque nocivam advehere materiam, inde probabile redditur, quia is fontem constituit, ex quo humor aqueus suum haurit nutrimentum. Eum quippe continuò & consumi & regenerari experientia testatur. Licet enim consilio aut casu dissipetur, non rarò tamen denuò restituitur, cujus rei hinc inde notatu digna occurrunt exempla, vid. *M. N. C. Dec. 1. An. 10. Obs. 74. Dec. II. An. 5. Obs. 55. Tulp. Obs. Med. L. I. Obs. 30. Nuck. Sialograph.* Quando itaque sanguis quantitate viscidarum tartarearumque particularum peccat, hæ facili negotio per ampliatis ductulorum poros aqueo humori communicantur, quibus foedatus non potest non pelluciditas
ipsius

ipsius turbari: exhalantibus ergò aut refluentibus particulis fluidioribus, residuæ viscidæ, aliis ramosis successivè accedentibus, sibi invicem arctius implicantur, ac demùm in pelliculam plus minùs opacam condensantur. Quicquid proindè sanguinis incrassationi ansam suppeditat, ut causa antecedens hujus mali jure meritove consideratur, huc itaque pertinent febres ardentes, lacrumatio diu protracta, scorbutus, cachexia, errores in sex rerum non naturalium usu commissi, quos tamen omnes ordine pertractare, tædiosum nimis prolixumque foret.

§. 18. Interdum humoris aquei puritas oculorum inflammatione, calidiorum collyriorum usu, aut si oculi diutius solito ignis flammæ objiciantur, turbatur. Quoniam enim calori vis aqueas particulas resolvendi dissipandique inest, sine dubio tunc temporis plus aquei quàm viscidi consumitur. Hoc proinde successive in humore aqueo congesto, ipsius pelluciditas obscuratur, atque eodem, ut antea diximus, modo suffusionis generationi occasio subministratur. Quandoque malum hocce nativum observatur. *Rarum enim est, quod in pueris unius anni observavi*, inquit Clar. Dolæus *Encyclop. Chir. Rat. L.I. C. XII. p. 199. cujus mater tunc temporis gravida, intuens hominem quandam ebrium oculos invertentem, inde perterrita peperit puerum prædictum duas pelliculas in binis oculis habentem*, similes historias *Herst. Obs. P. II. Fol. 633. Borell. Cent. III. Obs. 61.* consignarunt.

§. 19. Aliam cataractæ generationem describit *J. de La Charriere Nouvelles Operations de Chirurg. C. 30.* Siquidem Autor hicce pro indubitato habet, omnium partium rudimenta facta jamjam esse in prima conformatione, indeque fluere existimat, nullam membranam absolute contra naturam generari, sed omnem ab insensili cujusdam partis membranula nasci, adeoque nec cataractam aliter, quam ex pellicula exigua, ab humore crystallino separata, & humori aqueo communicata, formari. Atque hanc cataractæ generationem conceptu haud esse difficilem autumat, dummodo humoris crystallini subtiles, ex quibus compingitur, pelliculæ considerentur, atque figuræ mutatio observetur, quam, facta maturæ cataractæ depositione, ostendit, ubi ipsius anterior convexitas planior quodammodo facta conspicitur. Ingeniosa quidem hæc est hypothesis, multis tamen difficultatibus

tibus premitur. Esto enim in prima conformatione omnium partium, scilicet naturalium, poni rudimenta, inde tamen non sequitur, à particularum quarundam certa unione non posse corpus formari, ad membranæ naturam accedens. Contrarium quippe polypi vasorum sanguifluorum generatio docet, cujus rei memorabile exemplum *Th. Barthol.* allegat, ubi polypus dextrum ventriculum & auriculam occupavit, qui per omnes pene venas ramulos diffudit, ita ut exsiccatus pro systematis venosi schetiasmo inservierit *Actor. Hafn. Medic. Vol. V. Obs. 29.* Polypum vero taliusmodi, in plurimas pelliculas resolvablem, ortum non à membranula, sed à sanguine deducere, pereleganter acutiss. *Albinus, Prof. olim Francof. longe Celeberr. nunc Archiater Regis Prussiae meritiss. in Diss. de Polypo conscripta* ostendit, ad quam brevitas ergo B. L. remittimus. Deinceps si verum, humorem crystallinum ex meris componi pelliculis, quid dicendum erit de ejus regeneratione, de qua *vid. M. N. C. Dec. I. A. 6. p. 163. Burrhi Epistol. ad Barthol. data de artificio humores Oculor. restituendi.* Verisimile namque non est, humorem crystallinum, casu aut consilio ex oculi bulbo expressum, è pellicula quadam de novo formari. Quamobrem liceat quoque nunc dubitare, num humor crystallinus, naturaliter constitutus, ex veris pelliculis, quales sibi auctor concipit, construatur, contrarium docere videtur experientia. Quod si enim humor hicce calidus adhuc examini subjiciatur, is nequaquam in pelliculas resolvi potest. Ejus enim substantia, ex particulis glutinosis miro ordine dispositis ac laxè cohærentibus constans, præ mollietate citius diffluit, quam ut in taliusmodi pelliculas resolvi queat. Verum superveniente hujus humoris inspissatione & induratione, dum particule glutinosæ arctius uniuntur, hæ demum in pelliculas divisibiles condensantur. Quare cum pelliculæ hæ forsan magis artificiales quam naturales sint, non immerito dubitatur, posse humorem crystallinum ad generandam cataractam suppeditare membranulam, nisi fortassis ipsius induratio & exsiccatio præcesserit, qualem *Stenonius in Anat. Chazar. annotante Bartholino*, in muliere cæca observavit, verum tunc oriretur cæcitas, nullis medicamentis cedens, quæ tamen omnem cataractam haud sequitur. Quamobrem *Blancardi* sententia probabili-ori fundamento nititur, qua asseritur fieri interdum posse, ut casu, ictu, aliaque injuria, humori crystallino illata, ejus pellicula exi-

quo vulnuscule hiet, atque ex eo materia glutinosa stillet, quæ deinceps cataractæ materiam subministret, præprimis cum huic insignis aptitudo concresecendi in pelliculam insit. *Chir. Part. 2. C. 8.*

§. 20. Cataractam quomodocunque demum productam variis pingi coloribus, flavo puta, coeruleo similive, ex supra dictis jam jam constat. Quæritur proinde non immerito, quænam sit diversitatis colorum causa? Quantum ad partium solidarum colores diversorum humorum affluxus horumque stagnatio contribuat, cachexia, ictero, contusione, similive affectu laborantes docent. Horum enim partes albicantis alias coloris nunc flavescentes, nunc subnigricantes, nunc pallidæ, alioque modo discoloratæ apparent. Non improbabile itaque videtur pro succi nutritii & alluentium humorum natura hunc illumve cataractæ induci colorem.

§. 21. Quomodocunque tandem cataracta sit comparata, ejus præsentia omni tempore visui plus minus officit. Hujus itaque læsio seu privatio signum quidem præsentis cataractæ dat, cum vero ejus gradus sint varii, ad eos dignoscendos specifica requiruntur signa. Quocirca in principio hujus mali ad simulacra pilis, muscis, aranearumque telis simillima attendere convenit. Quamvis enim malum hoc nonnunquam multos duret annos sine subsequente cataracta perfecta, quale quid de se ipso testatur Plempius, hanc tamen communiter ut prodromus præcedere solet. Ut vero certo constet, simulacra hæc à particulis heterogeneis, a quo humori inexistentibus, provenire, attente oculus est inspiciendus, qui interdum tunc temporis non clarus atque limpidus, sed obscurus quodammodo ac conturbatus, aquæ impuræ non absimilis, apparet, cumque sensim albescere incipit, pupilla, vivido colore non amplius perfusa, aëri nebuloso similis deprehenditur. Quando suffusio in corpusculum quoddam solidius, pupillam ex parte aut ad medietatem obumbrans, coivit, tunc ea cognitu est facilius, præcipue si ad oculi frictum de loco mota observetur. Quod si cataracta totam integat pupillam, ejus immaturitas colligitur non ex visu tantum residuo, quo ægri omnia ceu per fumum crassum cernunt, aut candelæ radiorum, phialam aqua repletam, vel crystallinum globum transeuntium, colores adhuc distinguere valent, sed ex papebrarum quoque frictione, harumque subitanea apertione

C

qua

qua pellicula in partes divisa, aut valde mobilis conspicitur. Maturitatem contra concludimus, si oculo fricto licet, cataracta immobilis pene permaneat, atque æger præter lucis splendorem nihil plane oculo affecto videat. Equidem nonnulli ad maturitatem determinandam cum primis ad durationis tempus respiciunt, unde veteres vix ante sextum septimumve annum cataractæ depositionem aggrediebantur, verum experientia teste signum, inde desumptum, valde est fallax. *Georg. Bartisch in Tr. cui titul. Augen Dienst P. V. C. II. p. m. 64.* ait, se multoties observasse, quod cataractæ octodecim, viginti, imo triginta annorum acu tentatæ diffluerint, contra quæ vix sex, duodecim, viginti, aut triginta durarunt septimanas, feliciter fuerint depressæ, manifesto argumento, hujus affectus maturitatem non posse ex temporis mensura certo haberi. Inveteratam cataractam conjicimus partim ex consistentia, qua corneam non raro induit naturam, partim ex pertinaci adhæsiōe. Quando namque iridi aut etiam corneæ connata est, in illa lineolæ cataractæ concolores apparent, in hac punctula subalbida, atque filamenta, ad eam protensa, sese conspicienda sistunt. Denique de cataracta colorata dignoscenda non est ut verba faciamus, quippe quæ visui est obvia, cujus beneficio macula quædam rubra aliusve coloris, intra pupillam occurrens, conspicitur.

§. 22. Tametsi ex signis jam recensitis cataractæ conditio haberi queat, quoniam tamen cum gutta serena, glaucomate, pterygio, hypopyo &c. haud exiguam habet similitudinem, permultum interest, eam à jam nominatis affectibus probe distinguere. *Schenck. Obs. Med. L. I. de Ocul. Obs. 6. p. 125.* sequentia de ophthalmiatro habet: *Vidimus nos, inquit, Ocularium Medicum, qui glaucedines suffusiones esse arbitratus, deponere volens hominem excoecavit.* Ne itaque Chirurgus in similem incurrat errorem, necesse est, noscat non cataractæ naturam tantum, sed reliquos quoque affectus, quos cognatione attingit. Cataractam itaque à pterygio facile discernet, dummodo ad membrulam attendat, quæ in cataracta interiora, in pterygio vero exteriora occupat. Et quamvis Empyrici sæpius cataractæ pelliculam pro externa perperam habeant, ac ad eam exedendam corrosiva externe applicent, horumque perverso usu incriminabilem subinde inducant

ducant cœcitatem, attamen & hunc errorem judiciosus evitabit Chirurgus, dummodo corneæ pelluciditatem probe observet, quæ in suffusione est integra, obfusca vero, si exterius ipsi membranula superinsternitur. Idem judicium esto, quando hypopii tempore pus intra lamellas corneæ colligitur, tunc enim pariter hujus tunicæ obtenebratur pelluciditas, quam illæsam plerumque relinquit suffusio. Cum glaucoma humorem crystallinum impurum ac siccum reddit, color glaucus valdeq; profundus, non æque in cataracta conspicuus, observatur. Humoris vitrei atque nervi optici obstructio, quam postremam guttam serenam appellant Medici, haud difficulter à cataracta determinatur. Licet enim ea præsentē visus lædatur & extinguatur, oculus tamen serenus pellucidusq; apparet, qui contra in cataracta turbidus atque opacus animadvertitur.

§. 23. Expositis signis, quibus cataracta dignoscitur & ab aliis affectibus discriminatur, restitant ea adhuc enucleanda, quæ hujus affectus statum futurum prædicunt. In prognosi proinde circumspicte formanda non incommode cataractæ consistentia, color, & ægri conditio spectatur. Consistentiam quod attinet, sicuti hæc varia est, ita varium quoque indicit eventum. Quando enim cataracta nondum in pelliculam est inspissata, sæpe adhibitis medicamentis tum internis tum externis feliciter dissipatur, atque humor aqueus pristinae restituitur pelluciditati. Cum vero in membranulam jamjam coivit, incassum ordinarie adhibentur medicamenta. Quamvis enim cataractæ spissæ satis ac aliquot annorum medicamentis curatæ hinc inde legantur, vid. Reusner. Cur. è Biblioth. Velsch. 36. Holler. de morb. intern. C. XX. Schenck. Obs. L. I. p. 151. raræ tamen admodum sunt taliusmodi observationes, imo nonnunquam fidem pene superant. Audiamus super hac re Galenum L. IV. de Compos. Med. sec. loc. C. IV. ita differentem: *Quamvis, inquit, multa remedia & varia medicamenta in auctorum libris descripta reperiantur, quæ multa polliceri videntur, tamen cum ad experientiam devenimus, aut nihil omnino, aut parum eorum, quæ ipsi polliciti sunt, præstari experimur.* Cæteroquin si taliusmodi pellicula nondum est matura, ea nec acu est tentanda. Experientia quippe docente vel plumæ instar acus cuspidem effugit, vel discontinuata lactis instar diffluit, atque humorem aqueum turbidum reddit,

dit, unde idem visionis remanet vitium, vel magis adhuc intenditur. Quare tamdiu talis cataracta intacta est relinquenda, usque dum maturitatem nanciscatur. Quemadmodum vero immatura nonnunquam medicamentorum eludit efficaciam, ita hæc multo minus in maturæ curatione locum invenire videntur. *Hanc vero medicamentis tractare vanum omnino censeo*, inquit Mercatus de Intern. Morb. Curat. L. I. C. 21. *haud secus quam si vesica lapidem quis citra chirurgicam operationem velit conterere & extrahere.* Adeoque primaria spes in operatione consistit, hæcque salutarem omnino pollicetur effectum, quando æger cæteroquin sanus oculo affecto lucis splendorem adhuc percipit; quod si vero ne lucis quidem crepusculum, oculo soli licet objecto, sentiat, aut cataracta intimiore cohaesione committatur iridi, ita ut ad oculi frictum pupilla vix dilatetur, operatio non modo est laboriosior, sed nec speratum omni tempore post se relinquit effectum, præstat tamen operationem dubiam in usum trahere, quam cœcitate certam intactam relinquere. Malum denique inveteratum & medicamenta, & operationem respuit. Siquidem arctior ipsius nexus, quem cum aliis partibus habet, nonnisi summa violentia solvitur, & ejus durities se deprimi haud patitur.

§. 24. Secundo loco in prognosi formanda attendere convenit ad colorem, quo cataracta est tincta. Albus proinde color bonum prædicit eventum, dummodo hujus coloris cataracta nec nimis cito, nec nimis tarde acu pungatur. Quoniam enim vix ante sextum annum maturitatem adipiscitur, intra hoc tempus operatio haud convenit, contra si ejus depressio diutius procrastinetur, glaciale contrahit duritiem, atque operatione adhibita in lamellas tenuiores dissilit. Cataracta grysei coloris intra unius anni spatium subinde maturitatem acquirens, operationem cito adhibendam indicit, alias quippe crassa nimis duraque evadit. Coerulea plerumque curatu est difficillima, sicuti namque tarde maturitatem nanciscitur, sic interea temporis peluciditatem humorum destruit, ita ut depressa licet, visionis tamen insignem post se relinquat obscuritatem. Rubra minus quidem frequens est, pessima tamen censetur, hæc enim acu vel leniter tacta sanguinem plorat, qui oculum replens operationem reddit valde laboriosam, observatum tamen eum, elapsis aliquot diebus, denuo evanuisse. Viridis

ac flava citius maturescunt, imo posterior nonnunquam plus justo, adeoque ni maturitatis tempus probe observetur, atque hæ nimis crassæ evadant, nulla salus ab operatione est speranda. Regulæ tamen hæ de coloribus datæ, tam firmæ non sunt, quin non quandoque exceptionem patiantur. Quare ad prognosin judiciose instituendam non ad colorem tantum, sed ad consistentiam quoque & ægri conditionem, jam exponendam, est respiciendum.

§. 25. Quod itaque ægrotantis constitutionem concernit, hæc permultum cataractæ eventum variat. Quodsi enim æger mediocris ætatis nonnisi de cataracta conqueratur, cæteroquin bene sese habeat, reconvalescentiæ optima affulget spes; contra si cachexia, scorbutus, similive affectu laboret, cura vel ea propter est laboriosa, quia continuus peccantium humorum fit affluxus. Aut si æger capitis vel oculorum dolore, feбри, tussi, sternutatione, vomitu &c. divexetur, tamdiu ab operatione est abstinendum, usque dum emendatis his morbis tutius in usum deduci queat. Deniq; si præter cataractam nervorū opticorum cæterorumq; humorum obstructio adsit, aut oculus contabescat, manum de tabula. Talis enim cataracta curatu impossibilis pronunciatur.

§. 26. Perpensis iis, quæ ad morbi historiam pertinent, sequitur nunc cura paucis tradenda. Hanc ad ductum divisionis, qua cataracta in immaturam, maturam & inveteratam dispescitur, exponere lubet. Quod itaque suffusionis immaturæ curationem concernit, hæc triplex postulat remedium, scilicet diæteticum, pharmaceuticum & chirurgicum. Diætam exactam ad suffusionis curam requiri, ii cum primis docent, qui illius obliti ingentem non raro medicamentorum copiam incassum devorant. Talis proinde instituenda est diætæ, quæ curationem non impedit, sed promovet. Adeoque ante omnia aurea mediocritatis regula, ne quid nimis, & servanda, & serio suadenda est. Quem enim fugit cibum & potum, etiam si per se sint optimi, copia immoderata assumptos, degenerare in cruditates, quas tamen magis adhuc augment, quæ concoctu sunt difficilia, dyspepta alias dicta, qualia sunt pisces salsi & indurati, alimenta acida, carnes infumata, cerevisia sæculenta, similiaque. Hæc enim chylum reddunt plus minus crassum, ac peregrinis salibus inquinant, qualis vero chylus, talis sanguis, qualis sanguis, tales humores, quid mirum er-

go, si inquinamenta humoris aquei pariter augeantur. Quare potius cibus concoctu facilis, & potus tenuis atque defæcatus est seligendus, ac in horum usu modus probe servandus. Aër sicuti corporis humani sanitati permultum conducit, ita hanc pro diversa in eo excedente qualitate sæpius valdopere lædit. Nimis proin frigidus calidusque nocivus existit, ille enim frigiditate lentorem & condensationem humoribus inducit, hic nimiam feri quantitatem dissipando itidem humores inspissat atque incrassat. Motus cum quiete sit temperatus, immoderata enim corporis exagitatione humores rapidiori motu largiorique quantitate ad oculos feruntur, atque his quandoque nocumento existunt. Quietis vero nimium indulgens corpus ordinarie crassos fovet humores, quale iudicium esto quoque de somno nimio, hinc ad mala, ex eo provenientia, præcavenda illud excogitatum videtur

Septem horas dormiisse sat est juvenique senique

Vigiliarum excessus atque lucubrationes cum primis nocturnæ quantum oculos debilitent, atque suffusioni sæpius occasionem præbeant, Eruditorum infinitus pene numerus docet. Excrementa quamdiu modo justo sese habent, haud parum salutis adferunt corpori, si vero diutius solito retineantur, aut excessiva copia evacuentur, centena non modo in nobis excitant mala, sed suffusioni quoque ansam suppeditant, exempli causa insueta lochiorum, sanguinis menstrualis, seminis &c. suppressio, aut horum & præcipue seminis immoderata profusio. Quantum denique animi pathemata modum excedentia ad præsentis affectus generationem valeant, *Hildan. Cent. IV. Obs. XV.* clare docet, adeoque

Sit modus in rebus, sint certi denique fines,

Quos citra ultraque nequit consistere rectum.

§. 27. Nunc ad fontem pharmaceuticum, ordine nobis proposito, pergamus, hic duplicis generis medicamenta, interna nempe & externa, suggerit, quorum illa pro ægrotantis conditione varia denuo sunt. Quod si enim in primis viis cruditates occurrant, de earum tempestiva remotione est cogitandum. Hunc in finem itaque non incommode adhibentur, quæ leniter & successive humores peccantes per inferius guttur evacuant, talia sunt purgantia & laxativa e. g.

Mercur.

Mercur. dulc. aur. fulm. rad. & res. jalapp, fol. & extr. senn. aloës & ex ea parata, res. scammon. extr. trochiscor. alband. rad. polypod. crem. & crystall. tartar. arcan. dupl. similiaqve, ex quibus pro lubitu variæ remedium formæ parari possunt, quæ tamen cujuslibet prudentiæ relinquantur. Equidem nonnulli Practicorum vomitoria quoque sudent, hæc tamen vel ea propter suspecta videntur, quia hisce non modo totum concutitur corpus, sed præterea quoque illo vomendi nisu & fortiore diaphragmatis constrictione aorta descendens valde comprimitur, quæ compressa, sanguis concitatori motu pariter atque largiore quantitate ad caput fertur, quorsum translatus faciem rubore suffundit, & oculos intumescere facit, ita ut hi sæpius ex vomitu plurimum patiantur. Quando acrimonia acida in humoribus peccat, non inconvenienter ante purgantium quoque usum ant-acida adhibentur. Judiciosus verò Practicus facile intelliget, num Terreæ magis sint congruæ v. g. lap. cancr. C. C. ust. & sine igne præpar. eb. ust. corall. cret. &c. num Martial. limat. sc. mart. & ex ea parata tinct. num Alkal. tum volatilia Sp. salis ammon. sal. volat. C. C. succin. &c. tum fixa sal. absynth. card. ben. centaur min. &c. Neque etiam Mercurialia in omni suffusione contemnenda sunt, Schenkius enim Obs. Med. L. I. de Oculis Obs. II. p. 159. meminit cujusdam morbo gallico decumbentis, qui hydrargyri inunctione à morbo gallico & à suffusione liberatus fuit. Ad incidendas resolvendasque viscidas humorum particulas præter quædam ex jam commemoratis medicamentis sequentia quoque congruunt, sc. rad. scorzon. contrajerv. sarsap. lig. sanct. sassaf. horumque cortices sem. aquileg. card. ben. fœnic. fol. thée, herb. cupbrag. chelidon. maj. salv. rut. &c. Hæc & similia judiciose in apozematis forma adhibita exoptatum sæpius præstant effectum, præcipue si ipsis laxativa addantur. Tali enim modo uno remedio humores pravi edulcorantur, incrassati diluuntur, & nocivi evacuantur, quæ sunt præcipuæ indicationes in cura suffusionis interna observandæ. Et hæc est quoque causa, cur usus Thermarum Catolinarum per multis tam proficius existat. Quanta enim earum aquis, interne sumptis, virtus depurandi, resolvendi, & evacuandi humores pravi insit, neminem nostrorum Medicorum latere arbitror.

S. 28. A medicamentis internis ordine progredimur ad externa
f. To-

seu topica, quorum tantam farraginem nobis obtrudunt Practici, ut
 eorum selectu perquam opus habeamus. Cum autem causa mali sit
 materia lenta ac crassa, vim attenuandi incidendique ut medicamenta
 habeant, necesse est, quia tamen oculi bulbus ob exquisitam sensatio-
 nem nimis irritantia impune haut fert, caute in eorum applicatione
 procedendum est. *Heurnius de Morb. Ocul. C. IV. p. 479.* memorabilem
 ex *Hieron. Ruffo* recenset historiam: *Quod inspexi, inquit, non invol-*
vam silentio, nobilem Virum suffusione laborantem, cui usu aquæ vitæ in
oculo impositæ, cum materia ipsius concreta decidisset, ipse etiam humor
albugineus manavit, cornea quoque tunica aquæ vi non nihil exesa:
cumque in aliqua esset spe recuperandi visus omnem amisit. Sobrie ergo
 hac aqua similibusque remediis ad curandos oculos utendum est. Ex-
 perientia constat, usum aquæ euphrasie ad persanandos oculorum
 morbos esse valde proficuum. *Tanta enim euphrasie, ait Hildanus*
Cent. Epistol. L. IX. in imbecillitate visus vis est atque efficacia, ut ejus
usu septuagenarios quosdam, (propter vigilias atque studia plurima)
amissum visum in decrepita ista ætate recuperasse observaverim. Non-
 nulli ad augendas aquæ euphrasie vires tantillum aquæ vitæ, vel spir.
 matrical. aut spir. sal. ammon. addunt, alii Collyr. ex aq. chelidon.
 ℥vj. & croc. metall. 3j. confectum mirifice extollunt, utpote cujus septi-
 dæ tres quatuorve guttæ, oculis ter vel quater in die instillatæ, sine
 morfu valentissime malum abstergere creduntur. Et ut collyria eo
 melius in oculis detineantur, *Hieron. Fabric. ab Aquapend. Oper. Tit.*
de Suffus. p. m. 22. cucurbitam vitream, eum in finem oculis adaptan-
 dam, excogitavit, in cujus locum tamen lintea quadruplicata, oph-
 thalmicis remediis imbuta, atque oculo affecto imposita, commode
 substituuntur. Optimè quoque ad dissipandas aquei humoris impu-
 ritates foci instituuntur, sic decoctum croci mirabile censetur, si
 super illud oculi aperti detineantur, parilis virtus aq. chelid. maj. tri-
 buitur, ad cujus fumum in oculos recipiendum instrumenta necessaria
Lamzweerde Chir. Vet. & modern. prompt. Tab. XV. F. 8. depingit.
 Magnæ pariter efficacis sunt foci, ex herbis cephalicis v. g. herb.
 euphras. rorism. major. salv. Fl. chamomill. sambuc. &c. ac in vino
 decoctis parati, nec inepte quædam ex commemoratis herbis more
 nicotianæ accenduntur, harumque fumus fistula consveta haustus, in
 agro-

ægrotantis impellitur oculos. *Gesner. Epist. L. III. ad Job. Fabric. meminit* cujusdam medicaminis, ex fœce olei & omphacio i. e. de uvis acerbis parati, quod malum sine morfu & periculo curare dicitur. Similis virtutis aquam *Jul. Cas. Claudinus Empyrica Rational. L. II. C. XVIII. p. m. 498.* describit.

§. 29. Denique ad immaturam suffusionem curandam nonnunquam chirurgica quoq; remedia in subsidium vocari oportet, è quibus præ aliis fonticulus & setaceum laudem meretur, præcipue si præter suffusionem variis fluxionibus oculus infestetur aut catarrhis corpus divexetur. Quantum enim utilitatis oculis male constitutis hoc remedii genus pariat, clarè docet Historia, quam *Pareus L. IX. C. 24. de Fabro aurario* refert. *Is, inquit, multis multorum & Medicorum & Chirurgorum frustra usurpatis remediis, cum fere conclamata esset visionis, appresso, me consultore, pyrotico, sensim pro puris manantis ratione, acutius cernere cœpit, donec tandem acutissime cerneret. Tum igitur etsi semper pure ulcus manaret, setonis, quem annum integrum circumtulerat, pertusus ipsum detraxit atque ulcus cicatrice sibi obduci voluit: verum illo fluxionis sublato diverticulo, cum humor in oculos iterum se inferret, ac jam cæcitatis periculum immineret, me vocato ulcus cauterio aperiri, & setonem denuo immitti sibi curavit. Ex quo pristina oculorum & visionis integritati restitutus, etiam nunc setonem illum circumfere.*

§. 30. Hisce quidem remediis, prolixè satis recensitis, suffusioni immaturæ sæpe numero medemur, fieri tamen aliquando solet, ut vel usu eorum posthabito, vel iis licet adhibitis cataracta nihilominus incrementa quotidie capiat, ita ut deinceps medicamentis nil quicquam amplius proficere valeamus. Tali proindè in casu optimum est, à medicamentis abstinere atque tamdiu expectare, donec cataracta, matura facta, acu deponi queat. Ad operationem itaque rite concipiendam (1.) ad Operatorem, (2.) Tempus, (3.) Instrumenta, (4.) Ægri & Operatoris situm, (5.) Operationis modum (6.) Fasciationem attendere convenit.

§. 31. Qui cataractæ depositionem adornare sustinet, ante omnia exacta structuræ oculorum cognitione imbutus esse debet, sine ea enim non est, ut cito, tuto ac conscientiose operetur. Quid mirum ergo,

si Empyricorum ignorantia multi ægrotantium omni visionis spe priventur aut in periculosissima symptomata conjiciantur, ita ut de atrocissimis capitis & oculorum doloribus de die æque ac nocte conque- rantur, quos nonnunquam rabies, imo mors, ultima rerum linea, sequitur. Et quamvis interdum quidam Empyricorum dextre satis hanc operationem perficiant, ex iis tamen si quis quærat, qua metho- do talem sibi comparaverint dexteritatem, vereor, ne similem ferat responsionem, quam Ophthalmicus ille empyricus dedit, cujus mentio- nem *Freitag. Noct. Med. C. V. p. m. 19.* facit. *Is cum non infeciliter acu- punxisset aliquot suffusione laborantium oculos, rogatus, quomodo ar- tem istam tam accurate didicisset, respondit, se priusquam modum rite id perficiendi cognoverit, vel pileum plenum tentando & experiundo punctiorem oculorum effodisse, dignum me hercule tali artifice responsum, de hisce nebulonibus inquit Plinius, quod animas negotientur & experi- menta per mortes agant.* Hactenus Freitagius. Ut itaqve Chirurgus conscientia suæ haud innurat maculam, structuram oculi ex A- natomia hauriat, necesse est. Præterea requiritur in Operato- re, ut exquisita visus acie gaudeat, siquidem & ad conditionem ca- taractæ dignoscendam, & ad acum circumspecte dirigendam, visu profecto peracuto opus est. *Hieron. Fabr. ab Aquapend.* ne forte, dum aliorum oculos juvare cuperet, suos amitteret, ab hac operatio- ne destitit, tam attentus & exquisitus visus ad eam feliciter per- agendam requiritur. Denique Operator non timidus aut tremulas, sed firmas ac intrepidas manus habeat, atque ad eas suffulciendas, ne- cessitate urgente, instrumento, *ab Hildamo Cent. IV. Obs. XVI.* eum in finem excogitato, utatur. Postremo sit quoque ambidexter, ut ma- nu dextra & sinistra parili agilitate operari queat. Non enim sem- per dextra manu operatio est aggredienda, sed tantum eo tempore, quando oculus sinister cataracta laborat, contra quando dexter hoc affectu infestatur, sinistra artificis manus requiritur.

§. 32. Antequam Ophthalmiater operationem in se suscipiat, ipsi incumbit, ut tempus quoq; ad operandum congruum seligat. Quando itaque ipsum nulla necessitas ad operationem subito instituendam co- git, tempus vernale & autumnale reliquis non immerito præfertur, quod si vero certe circumstantia operationem urgeant, ea quoque æstivo æque

æque ac hyberno tempore locum invenit, dummodo ægrotans frigus intensum ac nimium calorem studiose vitet. Cæteroquin operationem die sereno minimeque turbido & quidem horis matutinis in loco, sufficienti lumine perfuso, adornare convenit.

§. 33. Præterea opus est, ut instrumenta, operationi adæquata, Ophthalmiatro sint ad manus, quæ in acu nitide fabrefacta & deligatonis apparatu consistunt. Equidem nonnulli ad distendendas palpebras, & oculi globum firmandum speculo, in annuli modum formato, utuntur, alii autem, neglecto hoc instrumento, pollice atque indice & palpebras distrahunt, & oculi bulbum immobilem tenent. Acum itaq; operationi dicatam & manubriolo insertam quod concernit, hanc artifices vel ex auro, & argento, vel chalybe conficiunt, multos tamen experientia docuit, argentum & aurum non esse adeo adæquata, quod acus, ex iis confectæ, nimis evadant flexiles, magis hinc chalybeas approbant, dummodo ex chalybe tenaciore, ne inter operandum dissiliant, fuerint factæ. De cætero acus sit probe polita, teres aut trifeca, quam postremam plures recentiorum magni omnino faciunt, iconem taliusmodi acus vid. *ap. Pareum L. XVI. C. XXII.*

§. 34. Acus jam delineata *Nuckio Experiment. Chirurg. VII.* non adeo congrua videtur. Cum enim culpis ipsius sit satis tenuis atq; acuta, Clariss. Autor metuit, ne hujus applicatione cataracta in partes discerperetur, vel vasa sanguiflua aliæve partes læderentur. Quocirca ad mala hæc evitanda *fig. I. & II.* duplicem acum, alteram acutam & excavatam, alteram obtusam, delineat. Illam sine terebratione per corneam trajicit, mox, eadem paululum retracta, ipsius crenulæ acus obtusæ cuspidem adaptat, eamque, remota acu excavata, leniter per foramen, à priori factum, impellit, hacque operationem absolvit. Verum hicce operandi modus priori laboriosior prolixiorque esse videtur. Quid si enim acus obtusa viam, ab acuta quodammodo factam, haud inveniat, quod ob acus acutæ tenuitatem, & scleroticæ lamellas, imo foraminis obliquitatem facillimo negotio fieri potest? anceps hinc hæreo, annon acus simplex sit præferenda, præcipue cum ab artifice perito applicata rarissime aliquid damni oculo inferat.

§. 35. Subinde fieri solet, ut cataracta, deposita licet, ad pristinum brevi commigret statum, huic incommodo ut obviam irent ope-

ratores varias excogitarunt acus. *Rechus Mattiolus, Chirurgus Italus* acu arundinea in mucronem vacuum desinente utebatur, qua, more fueto, applicata, oris suctu cataractam elicere conabatur. Quoniam tamen membranæ crassities exili orificii angustiae respondere haud videtur, atque verendum, ne humor aqueus citius pellicula exfugeretur, hujus acus usus in desuetudinem omnino abiit. Hanc brevi post emendatam dedit *Burrhus in Epistola*, quam ad *Barthol. de artific. ocul. humores restituendi* scripsit. *Mattiolo enim*, inquit, *auctor sui includendi suo tubulo aneo acuminato in modum tenuis penicilli subtilissima auri textilis filamenta, quæ in gyrum acta à conterquentibus digitis, dum acus tenebat medium orbitæ, educerentur quasi ex anea vagina, & humorum instar membranam vel interciperent, vel omnino in frustilla discerperent, atq; iterum post hoc officium retrahi possent ad angustias sui anei integumentum. vid. quoq; Lamzweerde Chirurg. vet. & modern. promptuar. Tab. XIV. Fig. II. & III. p. 63. & 71.* Quamvis vero hujus acus emendatio satis sit ingeniosa, multi tamen de ejus usu minus exoptato conquerentes, adhuc aliam adinvenire, quam icone expressam in *Dissert. de cataracta conscripta, & à Leopoldo Dieterico Gosky sub Albini Præsidio habita*, deprehendo. Hæc quidem vulgaris instar in cuspidem acutam desinit, ex duplici tamen componitur parte, altera incisura longa donata, altera elatere instructa, atque in prioris incisura recondita, ambæ tamen simulacum tam affabre factam constituunt, ut animadverti nequeat, eam ex duplici constare parte. Facta hujus acus, more recepto, applicatione, ejus elater ad arripiendam extrahendamque pelliculam, digito prematur necesse est, quod si vero prehensa per foramen educi non possit, sufficit eam foramini adduxisse. Tali enim pacto huic agglutinatur, atque ipsius reascensus impeditur. Utut vero acus hæc inventu subtilissima sit, permulti tamen de felici ejus usu ea de causa dubitant, quod propter scleroticæ duritiem acus crura non nisi violentia adhibita deduci possent, unde metuendum foret, ne durante operatione acus dissiliret, aut atrocissimi excitarentur dolores. Quare plures Operatorum lubentius vulgari utuntur, cujus applicandi modum nunc explicabimus.

§. 36. *Æger ad operationem rite præparatus, oculis luci objectis, atque sano interea temporis obligato, in sella collocetur, & à tergo adstans minister ejus contineat caput, ac immobile præstet, quo facto*

Chirur.

Chirurgus in scamno paululum altiore assideat, ita ut ægrotantis crura genibus suis divaricatis comprehendat, postmodum facta palpebrarum diductione, injungat ægro, ut oculum nares versus dirigat, quo eundem durante operatione in hoc situ firmiter detinere queat, quibus bene constitutis, Operator calami instar scriptorii tribus anterioribus digitis acum probe deterfam atque politamprehendat, eamque in cantho oculi externo mediæ albugineæ parti ad latitudinem straminis à cornea intrepide imprimat, atque eandem sensim terebrando per scleroticam trajiciat, & tamdiu leniter impellat, usque dum ad mediam pupillæ & cataractæ partem pervenerit, quorsum transmissa superne deorsum ad ipsam pelliculam inclinetur, ibique leniter vertatur, donec ab iridis margine paulatim separata, ad inferiorem oculi regionem fuerit deposita, in qua, oculo clauso, acus beneficio aliquamdiu detineatur, usque evanescente reascensus membranulæ metu, acus leniter extrahi queat.

§. 37. Sicuti hæc operatio summe est subtilis, ita certe omnes circumstantiæ probe sunt ponderandæ; quæritur hinc non immerito, unde Chirurgus certus esse possit, acum penetrasse scleroticam? Cum hujus tunicæ durities satis sit notabilis, Operator forationis tempore non potest non insignem experiri resistantiam, hac ergo remittente non immerito totalem ejus forationem concludit, cumque præterea acus oblique adigatur, cuspi, quamprimum posticam corneæ partem attingit, ob hujus pelluciditatem statim in sensus incurrit, atque tunc circumspecte ab humore aqueo ad cataractam elevari potest. Hinc valdopere hæsito, num eorum monitis semper obtemperandum sit, qui suadent, acum ita esse dirigendam, ut per uveam insuper trajiciatur, quo sic à tergo cataracta decuti queat. Quod si enim locus, cui acus imponitur, animadvertatur, is circiter est ille, ubi uvea ligamento circulari scleroticæ connascitur, atq; humor crystallinus uveæ immediate accumbit. Quamobrem conceptu difficile omnino est, posse acum sine vasorum sanguiflorum uveæ vel crystallini humoris læsione transmitti. Deinceps cum propter iridis opacitatem acus color translucere nequeat, ita ut Operator eandem conspiciere possit, ejus directionem difficultatis ac periculi esse plenam, nemini ignotum esse potest. Quare, nisi prægnantes circumstantiæ contrarium suadeant, autor essem, ut acus, statim ac corneam

D 3

transit,

transiit, ad cataractam dirigatur. Quemadmodum vero depressio-
nis cataractæ tempore iridis ac reliquarum partium læsio studiosissi-
me est evitanda; ita quoque eo allaborandum, ut integra abradatur
pellicula, quod si tamen hæc præter spem in partes fuerit divisa, hæc
summo studio ad inferiora sunt deprimendæ. Hæc pauci imperant,
ut æger oculum, acu licet intra eum adhuc constituta, commoveat,
quo sic appareat, num denuo cataracta sit ascensura, verum quia illo
motu acus facile in hanc illamve oculi partem posset impingere, tutius
est, cuspidē acus elevata, oculi aperti conditionem probe observare.
Quod si vero extracta jamjam acu, aut elapso aliquot dierum inter-
vallo, cataracta insperato ascensu pupillam denuo obnubilet, opera-
tio modo, supra delineato, est reiteranda.

§. 38. Facta, uti decet, operatione, plures Chirurgorum ægro
statim aliquid cernendum porrigunt, quoniam tamen hoc videndi co-
natu ad ascensum facile invitatur membranula, haud pauci, post ha-
bita hac cautela, utrumque statim deligant oculum. Ad deligatio-
nem itaque rite administrandam requiruntur medicamenta, plumaceola
& fascia quatuor circiter ulnas longa & duos digitos transversos lata.
Cum oculus ex operatione inflammationem ordinarie patiatur,
Chirurgi, multifaria experientia edocti, *albumen ovi in aqua rosacea*
agitatum, cui nonnunquam aliquid *aluminis vel croci* addunt, mollio-
ribus plumaceolis excipiunt, eaque oculo affecto ac partibus vicinis
imponunt, in quorum locum tamen pro circumstantiarum varietate
substitui possunt, quæ vim resolvendi & demulcendi dolores habent,
qualia sunt *euphras. melilot. sambuc. croc. camphor. spir. vini theriacal.*
crocat. camphorat &c. Hisce vero una cum plumaceolis rite appli-
catis, fascia sequentem in modum adaptetur, scil. fascia unius glomi
occipitio imponatur, & ab eo sub auricula dextra ad oculum ejusdem la-
teris, hinc per frontem & bregma sinistrum ad occiput ducatur, unde
per bregma alterum ac frontem, oblique intersecando prioris circum-
volutionem, ad oculum sinistrum, & deinde per hujus genam & sub
auricula sinistra ad occiput trahatur, atque per frontem ducta cir-
culari firmetur; quod si vero fascia duplicis glomi ad manus sit, me-
dia hujus pars occipitio applicetur, glomique utrumque sub auriculis
oblique ducantur ad oculos, & dsiniceps ad frontem, in qua se de-
cussan-

cussantes ad occiput trahantur, atque ex eo idem tractus vel repetatur, vel circularis formetur.

§. 39. Facta oculorum diligenti obfasciatione, æger pedetentim lectum, in conclavi tenebricoso repositum, ingrediatur, atque in dorso, capite paululum elevato, cubet, huncque situm per octiduum circiter servet, intra quod tempus ab omni violentiori motu abstineat, scilicet sternutatione, tussi, vociferatione, masticatione præprimis fortiore, aut totali corporis jactitatione. Cibum capiat concoctum facilem, uti sunt ova forbilia, jura carniū similiave, verbo, dietam supra occasione suffusionis immaturæ descriptam, exactissime servet. Chirurghi vero est, ut uno alteroque die elapso fasciationis apparatus auferat, atque non modo oculi constitutionem probe observet, sed secundum hanc plumaceola novis imbuat medicamentis, atque hunc laborem tam diu reiteret, usque dum die circiter decimo emenso, sine metu reascensus membranulæ, fasciæ removeri queant. Patiens interim lumini sensim sensimque assuescat, atque ad ejus splendorem moderandum oculis pannum sericum viridescentem præfigat, huncq; cum jamjam in luce clara obambulat, aliquamdiu gerat.

§. 40. Tali pacto nonnunquam oculus pristinam videndi facultatem recuperat, verumtamen quando cataracta nimis est inveterata, aut oculus præterea tabie similive affectu laborat, nulla profecto salus ab operatione, multo minus à medicamentis est speranda. Cum vero taliusmodi oculus aspectu sit ingratus, totamque faciem reddat deformem, chirurgiæ cultores oculum artificialem excogitarunt, cujus beneficio visum quidem non redintegrant, talem tamen oculo conciliant gratiam, ut ob similitudinem, quam cum naturali habet, vix ac ne vix quidem ab eo secerni valeat. Oculus autem artificialis est hemisphærium quoddam ex vitro confectum, atque ita configuratum coloratumque, ut externam oculi faciem exacte referat, hujus iconem vide apud *Sculter. in Append. Tab. XIX. Fig. I. II. III.* Equidem nonnulli eum ex aurea aut argentea lamina excavata & vitro obducta componunt, constat tamen, ex simili materia constructum oculum brevi mutare splendorem, atque palpebræ præprimis inferiori propter ponderositatem notabilem mole-

stiam

stiam inferre, contra ex vitro factum diutius retinere colorem, & propter levitatem sine notabili incommodo ab ægris gestari. Cæteroquin prioribus diebus non inepte lamina plumbea, eodem modo fabricata, applicatur, quo sic oculus æger taliusmodi capsulæ sensim asuescat, postmodum vero singulis mane, oculo depurato, artificialis adaptetur, ita ut palpebræ ejus peripheriam ubique complectantur. Sic enim fieri solet, ut commoto oculo ægro artificialis perinde ac sanus moveatur, quod si tamen oculus male constitutus tabie aut atonia affligatur, artificialis immobilis permanet. Cum vero patiens cubile ingreditur, non incommode oculum deponit artificialem. Quamvis enim taliusmodi ægri relicto oculo artificiali somnum capere queant, ex ejus tamen gestatione diutina molestiam sentiunt satis insignem. Præstat proinde eundem vesperi eximere, atque instrumento congruo externe oculum obfirmare. Atque sic brevitatis studiosi filum dissertationis nostræ abrumpimus, sperantes, B. L. ea, quæ minus accurate excussa sunt, in meliorem partem esse interpretaturum.

SOLI DEO GLORIA.

